

COMIRNATY Ómicron XBB.1.5 Vacuna ARNm contra COVID-19, suspensión, 30mcg, 10mcg. Inyectable Pfizer

La vacuna contra el COVID-19 que a usted se le aplicará es la COMIRNATY Ómicron XBB.1.5 Pfizer, la cual previene la enfermedad de coronavirus causada por el SARS-CoV-2 de acuerdo con las variantes que circulan actualmente. Esta hoja informativa contiene información relevante para entender los riesgos y beneficios de recibir la vacuna COMIRNATY XBB.1.5 Pfizer.

La vacuna COMIRNATY Ómicron XBB.1.5 Pfizer no evita que usted adquiera la enfermedad, pero si previene las complicaciones que pudiera generar la infección. Esta vacuna está aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en México.

La vacuna COMIRNATY Ómicron XBB.1.5 se administra en una sola dosis, en el brazo a nivel muscular, excepto en algunas situaciones: no haber recibido un esquema previo debiendo informarle a nuestro personal de salud vacunador, y otro caso como enfermedades con inmunosupresión.

LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE RECIBIR LA APLICACIÓN DE LA VACUNA.

1. ¿Qué es COVID-19?

La enfermedad por COVID-19 es causada por un coronavirus llamado SARS-CoV-2. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) a principios del año declaró el día de la emergencia en salud pública a nivel internacional de COVID-19, sigue siendo una prioridad de salud pública a nivel global que debe continuar vigilándose y controlándose como el resto de las enfermedades infecciosas.

Sus síntomas más frecuentes incluyen fiebre, escalofríos y dolor de garganta. Aunque también puede producir con menor frecuencia astenia intensa (fatiga), mialgias (dolor muscular) o síntomas respiratorios. La mayoría de la población cursará con síntomas leves, pero otros, sobre todo las poblaciones más vulnerables, podrán desarrollar sintomatología grave.

2. ¿Qué es COMIRNATY Ómicron XBB.1.5?

Es una vacuna contra COVID-19 ARNm monovalente aprobada para administrarse durante la campaña otoño-invierno 2023-2024.

3. ¿Qué información es importante compartir con el personal de salud antes de recibir la vacuna contra la variante Ómicron XBB.1.5 de COMIRNATY?

Informarle al personal de salud que lo vacune sobre si usted:

- Es alérgico a cualquier componente de la vacuna (incluyendo polietilenglicol). Si hay duda de como saber si es alérgico a polietilenglicol, considere si ha presentado alguna reacción alérgica a medicamentos intravenosos o incluso a uno de los medicamentos que la contienen como el CONTUMAX.
- Ha presentado alguna reacción de hipersensibilidad grave (de tipo anafiláctico) o una reacción alérgica inmediata de cualquier gravedad a una dosis previa de vacuna de ARNm frente a la COVID-19.

4. ¿Quién debe recibir la vacuna COMIRNATY Ómicron XBB.1.5?

Esta aprobada para aplicarse a cualquier persona considerando las siguientes presentaciones que a continuación se mencionan. La presentaciones con las que cuenta CHRISTUS MUGUERZA es para:

- Personas de 12 años en adelante.
- Niños de 5 a 11 años

5. ¿Quién no puede recibir la vacuna COMIRNATY Ómicron XBB.1.5?

Usted no debe recibir la vacuna si:

- Tuvo una reacción alérgica a cualquier componente de esta vacuna (ver pregunta 3)
- La vacuna debe posponerse en caso de enfermedad aguda grave que no sea probable COVID-19, para evitar una posible confusión de reacción a la vacuna. Pero en caso de presentar una enfermedad leve sin fiebre o sin afectación sistémica no es una razón válida para posponer la vacunación.
- Posponer en caso de síntomas sospechosos de COVID-19 o con COVID-19 confirmada.

6. ¿Cómo se administra vacuna COMIRNATY Ómicron XBB.1.5?

- Se debe administrar en forma inyectable en el músculo del brazo.
- Se administra en una sola dosis.

7. ¿Cuáles son las reacciones adversas de la vacuna COMIRNATY Ómicron XBB.1.5?

- Reacciones en el lugar en donde se aplicó la inyección como dolor, enrojecimiento e hinchazón.
- Efectos secundarios como dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular, náuseas y fiebre.
- También se han observado muy raramente casos de miocarditis y pericarditis después de la administración de
- Comirnaty, fundamentalmente en varones jóvenes en esquemas anteriores, tras la segunda dosis.

8. ¿Puedo recibir la vacuna COMIRNATY Ómicron XBB.1.5 con otras vacunas?

Se puede administrar en conjunto con otras vacunas, solo en lugares anatómicos diferentes. (vacuna influenza, neumococo).

9. ¿Qué debo hacer si estoy embarazada o amamantando?

No hay contraindicación para la vacunación en ningún trimestre del embarazo ni en el período de lactancia. Se debe apoyar para que las embarazadas se les vacune durante el periodo de máximo riesgo de complicaciones en caso de infección por SARS-CoV-2 (finales del segundo y tercer trimestre del embarazo). En caso de dudas, pregunta a tu médico.